

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الديوان الوطني لامتحانات والمسابقات
دورة: جوان 2012

وزارة التربية الوطنية
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة : علوم تجريبية


المدة: 3 ساعات ونصف

اختبار في مادة: الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
الموضوع الأول

التمرين الأول: (55 نقط)

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة بحدّها الأول $u_0 = 1$ و من أجل كل عدد طبيعي n .



لتكن h الدالة المعرفة على المجال $\left[-\frac{3}{2}; +\infty\right]$ كما يلي:

$h(x) = \sqrt{2x + 3}$ تمثيلها البياني و (Δ)

المستقيم ذو معادلة $y = x$ في المستوى المنسوب إلى

معلم متعامد ومتجانس. (انظر الشكل المقابل).

أ) - أعد رسم الشكل المقابل على ورقة الإجابة ثم مثل على محور الفواصل الحدود u_0, u_1, u_2 و u_3 .

(دون حسابها و موضحا خطوط الإناء).

ب) - ضع تخمينا حول اتجاه تغير (u_n) و تقاربها.

2) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n :

$0 < u_n < 3$. (أ) - ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) .

ب) - استنتج أنّ المتتالية (u_n) متقاربة، ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

التمرين الثاني: (40 نقط)

1) نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة \mathbb{C} المعادلة ذات المجهول z التالية:

$z = \frac{3i(z+2i)}{z-2+3i}$ حيث $(z \neq 2-3i)$.

- حل في \mathbb{C} هذه المعادلة.

2) ينسب المستوى المركب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$. A و B نقطتان لاحقاً هما على

$$z_A = 1+i\sqrt{5} \quad z_B = 1-i\sqrt{5}$$

- الترتيب : z_A و z_B حيث :

- تحقق أنّ A و B تتميّان إلى دائرة مركزها O يطلب تعين نصف قطرها.

3) نرفق بكل نقطة M من المستوى لاحتقها z ، النقطة $'M'$ لاحتقها z' حيث $z' = \frac{3i(z+2i)}{z-2+3i}$ حيث $(z \neq 2-3i)$.

- لواحقها على الترتيب: $z_E = 3i$ ، $z_D = 2-3i$ ، $z_C = -2i$ و (Δ) محور القطعة $[CD, E, D, C]$.

أ- عَبَرْ عن المسافة OM' بدلالة المسافتين CM و DM .

ب- استنتج أَنَّه من أجل كل نقطة M من (Δ) فإنَّ النقطة M' تنتهي إلى دائرة (γ) يطلب تعين مركزها ونصف قطرها. تحقق أن E تنتهي إلى (γ) .

التمرين الثالث: (04 نقاط)

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس (P) ذا المعادلة: $\left(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\right)$. نعتبر المستوى (P) ذو المعادلة: $C(-1;3;1) \cdot A(1;-2;5), B(2;2;-1) \cdot 14x + 16y + 13z - 47 = 0$.

أ- تتحقق أَنَّ النقط A, B و C ليست في استقامية.

ب- بين أَنَّ المستوى (ABC) هو (P) .

(2) جد تمثيلاً وسيطياً للمستقيم (AB) .

(3) أ- اكتب معادلة ديكارتية للمستوى المحوري (Q) للفعلة $[AB]$.

ب- تتحقق أَنَّ النقطة $D\left(-1;-2;\frac{1}{4}\right)$ تنتهي إلى المستوى (Q) .

ج- احسب المسافة بين النقطة D والمستقيم (AB) .

التمرين الرابع: (07 نقاط)

لتكن f الدالة المعرفة على المجال $[-\infty; 0)$ كما يلي: $f(x) = x + 5 + 6 \ln\left(\frac{x}{x-1}\right)$. تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس (C_f) .

أ- احسب $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ ، ثم فسر النتيجة هندسيا.

ب- احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

(2) بين أَنَّه من أجل كل عدد حقيقي x من $[-\infty; 0)$.
 $f'(x) = \frac{x^2 - x - 6}{x(x-1)}$

استنتاج اتجاه تغير الدالة f ، ثم شُكُّل جدول تغيراتها.

(3) أ- بين أَنَّ المستقيم (Δ) الذي معادلة له: $y = x + 5$ هو مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $-\infty$.

ب- ادرس وضع المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) .

(4) بين أَنَّ المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلَّين α و β حيث $-3,4 < \alpha < -3,5$ و $-1 < \beta < -1,1$.

(5) أنشئ المنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) .

(6) أ- نعتبر نقطتين $B\left(-2; \frac{5}{2} + 6 \ln\left(\frac{3}{4}\right)\right)$ و $A\left(-1; 3 + 6 \ln\left(\frac{3}{4}\right)\right)$.

بين أَنَّ $y = \frac{1}{2}x + \frac{7}{2} + 6 \ln\frac{3}{4}$ معادلة ديكارتية للمستقيم (AB) .

ب- بين أَنَّ المستقيم (AB) يمس المنحنى (C_f) في نقطة M_0 يطلب تعين إحداثياتها.

(7) لكن g الدالة المعرفة على $[-\infty; 0)$ كما يلي: $g(x) = \frac{x^2}{2} + 5x + 6x \ln\left(\frac{x}{x-1}\right) + 6 \ln(1-x)$

بين أَنَّ g دالة أصلية للدالة f على المجال $[-\infty; 0)$.

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (5 نقاط)

. $u_{n+1} = 3 + \sqrt{u_n - 3}$: $u_0 = \frac{13}{4}$ و من أجل كل عدد طبيعي n :

(1) برهن بالترابع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $3 < u_n < 4$

(2) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} - u_n = \frac{-u_n^2 + 7u_n - 12}{\sqrt{u_n - 3} + u_n - 3}$. استنتج أن (u_n) متزايدة تماما.

(3) ببرّر لماذا (u_n) متقاربة.

. $v_n = \ln(u_n - 3)$ (4) المتالية المعرفة على \mathbb{N} بـ:

أ) برهن أن (v_n) متالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ ، ثم احسب حدّها الأول.

ب) اكتب كلاً من v_n و u_n بدلالة n ، ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

ج) نضع من أجل كل عدد طبيعي n :

. $P_n = (u_0 - 3)(u_1 - 3)(u_2 - 3) \times \dots \times (u_n - 3)$. اكتب P_n بدلالة n ، ثم بين أن $\lim_{n \rightarrow +\infty} P_n = \frac{1}{16}$

التمرين الثاني: (4 نقاط)

في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، نعتبر النقط $A(-1; 0; 1)$ ، $B(2; 1; 0)$ و $C(1; -1; 0)$

(1) بين أن النقط A ، B و C تُعَيّن مستويا.

(2) بين أن $2x - y + 5z - 3 = 0$ هي معادلة ديكارتية للمستوي (ABC)

(3) $H\left(\frac{13}{15}; -\frac{13}{30}; \frac{1}{6}\right)$ و $D(2; -1; 3)$ نقطتان من الفضاء حيث:

أ- تحقق أن النقطة D لا تتبع إلى المستوي (ABC)

ب- بين أن النقطة H هي المسقط العمودي للنقطة D على المستوي (ABC)

ج- استنتاج أن المستويين (ABC) و (ADH) متعامدان، ثم جد تمثيلا وسيطيا لتقاطعهما.

التمرين الثالث: (5 نقاط)

(1) $P(z) = z^3 - 12z^2 + 48z - 72$ حيث: كثير الحدود للمتغير المركب z

أ- تتحقق أن 6 هو جذر لكثير الحدود $(P(z))$

ب- جد العددين الحقيقيين α و β بحيث من أجل كل عدد مركب z :

ج- حل في مجموعة الأعداد المركبة \mathbb{C} ، المعادلة $P(z) = 0$

(2) المستوى المركب منسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $C, B, A \cdot (O; \vec{u}, \vec{v})$ نقط من المستوى المركب لواحقها على الترتيب : $z_C = 3 - i\sqrt{3}$ ، $z_B = 3 + i\sqrt{3}$ ، $z_A = 6$ و z_A كلاً من z_B و z_C على الشكل الأسني.

ب- اكتب العدد المركب $\frac{z_A - z_B}{z_A - z_C}$ على الشكل الجبري، ثم على الشكل الأسني.

ج- استنتج طبيعة المثلث ABC .

(3) ليكن S التشابه المباشر الذي مركزه C ، نسبته $\sqrt{3}$ و زاويته $\frac{\pi}{2}$.

أ- جد الكتابة المركبة للتشابه S .

ب- عين z_A لاحقة النقطة A' صورة النقطة A بالتشابه S .

ج- بين أنَّ النقط A', B, A في استقامية.

التمرين الرابع: (07 نقاط)

(I) لتكن g الدالة المعرفة على \mathbb{R} كما يلي:

$$(1) \text{ احسب } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) \text{ و } \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x).$$

(2) ادرس اتجاه تغير الدالة g ، ثم شكل جدول تغيراتها.

(3) أ- بين أنَّ المعادلة $0 = g(x)$ تقبل حلًا وحيدا α على المجال $[-1; +\infty]$.

ب- تحقق أنَّ $0 < \alpha < 0,5$ ، ثم استنتج إشارة $g(x)$ على \mathbb{R} .

(II) نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $[-\infty; 2]$ كما يلي:

(C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

$$(1) \text{ احسب } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x).$$

(2) لتكن $'f$ مشقة الدالة f . بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $[-\infty; 2]$ فإن:

استنتاج إشارة $'f(x)$ على المجال $[-\infty; 2]$ ، ثم شكل جدول تغيرات الدالة f .

$$(3) \text{ بين أنَّ } f(\alpha) = -\left(\frac{\alpha^2 + 1}{\alpha}\right) \text{ ، ثم استنتج حصراً للعدد } f(\alpha). \text{ (تدور النتائج إلى } 10^{-2}).$$

(4) أ- بين أنَّ المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = -x - 1$ هو مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $-\infty$.

ب- ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى (Δ).

(5) أ- بين أنَّ المعادلة $0 = f(x)$ تقبل حلَّين x_1 و x_2 حيث $-1,5 < x_2 < 1,6$ و $-1,6 < x_1 < -1,5$.

ب- أنشئ (Δ) و (C_f) .

(6) لتكن h الدالة المعرفة على \mathbb{R} كما يلي:

أ- عين العددين الحقيقيين a و b بحيث تكون h دالة أصلية للدالة $x \mapsto x e^x$ على \mathbb{R} .

ب- استنتاج دالة أصلية للدالة g على \mathbb{R} .