

UNIVERSITE OUAGA I
Pr Joseph KI-ZERBO
Office du Baccalauréat

Série D

Année 2019
Session de remplacement
Epreuve du 2ème tour
Durée : 4 heures
Coefficient : 5

EPREUVE DE MATHÉMATIQUES

Les calculatrices ne sont pas autorisées.

Cette épreuve comporte deux (2) pages.

Exercice 1 (4 points)

- 1) Ecrire le complexe $d = (5 - i)^2$ sous forme algébrique. (0,25 point)
- 2) Soit P le polynôme défini par : $P(z) = z^3 + 5z^2 + (5 - 8i)z - 35 - 20i$
 - a) Vérifier que $-4 - 3i$ est une racine de P . (0,25 point)
 - b) En déduire une factorisation de $P(z)$. (0,5 point)
 - c) Résoudre dans \mathbb{C} , l'équation $P(z) = 0$. (0,5 point)
- 3) Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormal direct (O, \vec{u}, \vec{v}) d'unité graphique 1 cm, on considère les points A, B , et C d'affixes respectives $z_A = -3 + 2i$, $z_B = 2 + i$ et $z_C = -4 - 3i$.
 - a) Placer les points A, B et C dans le repère. (0,5 point)
 - b) Soit $Z = \frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}$.
Ecrire Z sous forme algébrique. (0,5 point)
 - c) Interpréter géométriquement le module et un argument de Z puis préciser la nature exacte du triangle ABC . (0,5 point)
- 4) Soit \vec{W} le vecteur défini par : $\vec{W} = 3\vec{AB} - \vec{AC} + 2\vec{BC}$
 - a) Déterminer l'affixe du vecteur \vec{W} . (0,25 point)
 - b) Calculer l'affixe du point E image du point A par la translation de vecteur \vec{W} . (0,25 point)
 - c) Placer le point E dans le repère (O, \vec{u}, \vec{v}) . (0,25 point)
 - d) Déterminer la nature exacte du quadrilatère $ABEC$. (0,25 point)

Exercice 2 (4 points)

Dans le plan muni du repère orthonormal (O, \vec{i}, \vec{j}) (unité graphique 1 cm), on considère la courbe (C) dont une représentation paramétrique est :
$$\begin{cases} x(t) = 4 \cos 2t \\ y(t) = 2 \sin 4t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

On désigne par $M(t)$ le point de coordonnées $(x(t); y(t))$.

- 1) Comparer :
 - a) $M(-t)$ et $M(t)$. (0,25 point)
 - b) $M\left(t + \frac{\pi}{2}\right)$ et $M(t)$. (0,25 point)
- 2) Interpréter géométriquement chacun des résultats précédents. (0,5 point)
- 3)
 - a) Montrer que π est la période commune aux fonctions x et y . (0,5 point)
 - b) Déduire de tout ce qui précède, que l'on peut restreindre le domaine d'étude des fonctions x et y à l'intervalle $I = \left[0; \frac{\pi}{4}\right]$. (0,5 point)

- 4) a) Etudier les variations de x sur I . (0,5 point)
 b) Vérifier que pour tout t élément de I , on a $y'(t) = 16 \left(\cos 2t - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \left(\cos 2t + \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$.
 En déduire les variations de y sur I . (0,5 point)
 c) Dresser le tableau de variations conjoint de x et y . (0,5 point)
- 5) Tracer (C) . (0,5 point)
 On donne $\sqrt{2} = 1,4$.

Problème (12 points)

On considère la fonction f définie sur $]1; +\infty[$ par : $f(x) = \begin{cases} -x + 2 + 2 \ln(x - 1) & \text{si } x \in]1; 2[\\ x - 3 + e^{2-x} & \text{si } x \in [2; +\infty[\end{cases}$

On note (Γ) la courbe représentative de f dans le repère orthonormal (O, \vec{i}, \vec{j}) . (unité graphique 2 cm) On notera f' la dérivée de f .

Partie A (8 points)

- 1) a) Etudier la continuité de f en 2. (0,5 point)
 b) Etudier la dérivabilité de f en 2. Donner une interprétation géométrique du résultat obtenu. (1 point)
- 2) a) Calculer les limites de f en 1 et en $+\infty$. En déduire que (Γ) admet une asymptote verticale (Δ) dont on précisera une équation cartésienne. (1,5 point)
 b) Calculer $f'(x)$ pour $x > 1$ et $x \neq 2$. Etudier son signe. (1 point)
 c) En déduire le sens de variations de f , puis dresser son tableau de variation. (0,5 point)
- 3) Montrer que la droite (D) d'équation $y = x - 3$ est une asymptote à la courbe (Γ) . (0,5 point)
- 4) Tracer (Γ) , (Δ) , (D) et les demi tangentes éventuelles. (1,5 point)
- 5) Soit g la restriction de f à $]1; 2[$.
 a) Montrer que g admet une application réciproque g^{-1} dont on précisera les ensembles de départ et d'arrivée. (1 point)
 b) Construire la courbe (Γ') représentative de g^{-1} dans le même repère que (Γ) . Justifier la construction. (0,5 point)

Partie B (4 points)

Soit h la fonction définie sur $[2; +\infty[$ par $h(x) = -f(x)$

- 1) Sans étudier explicitement h , construire en pointillés la courbe représentative (C) de h dans le même repère puis justifier. (0,5 point + 0,5 point)
- 2) On considère un réel α supérieur à 3. Soit $\mathcal{A}(\alpha)$ l'aire du domaine délimité par les droites d'équations $x = 3$, $x = \alpha$, $y = x - 3$ et la courbe (Γ) .
 a) Calculer $\mathcal{A}(\alpha)$ en cm^2 . (0,5 point + 0,5 point)
 b) Déterminer $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \mathcal{A}(\alpha)$. (0,5 point + 0,5 point)
- 3) On désigne par (S) le domaine plan délimité par les courbes (Γ) et (C) et les droites d'équation $x = 2$ et $x = 3$. On note \mathcal{V} le volume du solide engendré par la rotation de (S) autour de l'axe des abscisses.
 a) A l'aide d'une intégration par parties, calculer $\int_2^3 (x - 3)e^{2-x} dx$. (0,5 point)
 b) Calculer le volume \mathcal{V} en cm^3 . (0,5 point)
- On donne : $\ln 2 \simeq 0,7$; $e^{-1} \simeq 0,3$

Fin