

# الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

## الدورة العادية 2013

### الموضوع



NS24



4	مدة الإختبار	الرياضيات	المادة
9	المعامل	شعبة العلوم الرياضية (أ) و (ب)	الشعبة أو المسلك

- مدة إنجاز الموضوع هي أربع ساعات.
- يتكون الموضوع من ثلاثة تمارين ومسألة مستقلة فيما بينها .
- يمكن إنجاز التمارين والمسألة حسب الترتيب الذي يرغب فيه المترشح.

- التمرين الأول يتعلق بالبنىات الجبرية.....(3.5ن)
- التمرين الثاني يتعلق بالأعداد العقدية.....(3.5ن)
- التمرين الثالث يتعلق بالحسابيات.....(3ن)
- المسألة تتعلق بالتحليل.....(10ن)

يسمح باستعمال الآلة الحاسبة غير القابلة للبرمجة

لا يسمح باستعمال اللون الأحمر بورقة التحرير

**التمرين الأول : (3.5 نقط)**

نذكر أن  $(\square, +, \times)$  حلقة واحدة تبادلية و كاملة .

1- نزود  $\square$  بقانون التركيب الداخلي \* المعرفة بما يلي:  $x * y = x + y - 2$  ;  $(\forall (x, y) \in \square^2)$

(أ) بين أن القانون \* تبادلي و تجميعي . 0.5

(ب) بين أن  $(\square, *)$  يقبل عنصرا محايدا يتم تحديده. 0.25

(ج) بين أن  $(\square, *)$  زمرة تبادلية . 0.5

2- نزود  $\square$  بقانون التركيب الداخلي T المعرفة بما يلي:  $xTy = xy - 2x - 2y + 6$  ;  $(\forall (x, y) \in \square^2)$

ونعتبر التطبيق f من  $\square$  نحو  $\square$  المعرفة بما يلي:  $f(x) = x + 2$  ;  $(\forall x \in \square)$

(أ) بين أن التطبيق f تشاكل تقابلي من  $(\square, \times)$  نحو  $(\square, T)$  0.5

(ب) بين أن:  $(\forall (x, y, z) \in \square^3)$  ;  $(x * y)Tz = (xTz) * (yTz)$  0.25

3- استنتج من كل ما سبق أن  $(\square, *, T)$  حلقة تبادلية و واحدة. 0.75

4- (أ) بين أن:  $xTy = 2$  إذا و فقط إذا كان  $x = 2$  أو  $y = 2$  0.25

(ب) استنتج أن الحلقة  $(\square, *, T)$  كاملة . 0.25

(ج) هل  $(\square, *, T)$  جسم؟ (علل جوابك) 0.25

**التمرين الثاني: (3.5 نقط)**

**I** - ليكن a عددا عقديا غير منعدم.

نعتبر في المجموعة  $\square$  المعادلة ذات المجهول z :  $2z^2 - (3 + i\sqrt{3})az + (1 + i\sqrt{3})a^2 = 0$  : (E)

1- تحقق أن مميز المعادلة (E) هو:  $(-1 + i\sqrt{3})^2 a^2$  0.25

2- حل في  $\square$  المعادلة (E) 0.5

**II** - المستوى العقدي منسوب إلى معلم متعامد ممنظم و مباشر  $(O, \vec{u}, \vec{v})$ .

نعتبر النقط A و B و M التي ألقاها على التوالي a و  $b = ae^{i\frac{\pi}{3}}$  و z

ليكن r الدوران الذي مركزه M وزاويته  $\frac{\pi}{3}$

نضع :  $A_1 = r^{-1}(A)$  و  $B_1 = r(B)$  (حيث  $r^{-1}$  هو الدوران العكسي للدوران r)

ليكن  $a_1$  و  $b_1$  لحقي  $A_1$  و  $B_1$  على التوالي .

1- تحقق أن المثلث OAB متساوي الأضلاع. 0.5

2- (أ) بين أن :  $b_1 = \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)a + \left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z$  و  $a_1 = \left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)a + \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z$  0.5

(ب) بين أن الرباعي  $OAMB_1$  متوازي الأضلاع. 0.5

3- نفترض أن  $M \neq B$  و  $M \neq A$

(أ) بين أن :  $\frac{z - b_1}{z - a_1} = -\frac{z - b}{z - a} \times \frac{a}{b}$  0.5

(ب) بين أن النقط  $M$  و  $A_1$  و  $B_1$  مستقيمية إذا و فقط إذا كانت النقط  $M$  و  $O$  و  $A$  و  $B$  متداورة. 0.75

### التمرين الثالث: (3 نقط)

الهدف من التمرين هو البحث عن الأعداد الصحيحة الطبيعية  $n$  الأكبر قطعا من 1 و التي تحقق الخاصية :

$$(R): 3^n - 2^n \equiv 0 \pmod{n}$$

1- نفترض أن  $n$  يحقق الخاصية (R) و ليكن  $p$  أصغر قاسم أولى موجب للعدد  $n$

(أ) بين أن :  $3^n - 2^n \equiv 0 \pmod{p}$  ثم استنتج أن  $p \geq 5$  0.75

(ب) بين أن :  $3^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$  و  $2^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$  0.5

(ج) بين أنه يوجد زوج  $(a, b)$  من  $\mathbb{Z}^2$  بحيث :  $an - b(p-1) = 1$  0.5

(د) ليكن  $r$  و  $q$  باقي و خارج القسمة الاقليدية للعدد  $a$  على  $p-1$  0.5

$$(a = q(p-1) + r \text{ حيث : } 0 \leq r < p-1 \text{ و } q \in \mathbb{Z})$$

بين أنه يوجد عدد صحيح طبيعي  $k$  بحيث :  $rn = 1 + k(p-1)$

2- استنتج من كل ما سبق أنه لا يوجد عدد صحيح طبيعي  $n$  أكبر قطعا من 1 يحقق الخاصية (R) 0.75

### مسألة: (10 نقط)

نعتبر الدالة العددية  $h$  المعرفة على المجال  $[1, +\infty[$  بما يلي :  $h(1) = 1$  و  $h(x) = \frac{x-1}{x \ln x}$  ( $\forall x > 1$ )

#### الجزء الأول:

1- (أ) بين أن الدالة  $h$  متصلة على اليمين في 1 0.25

(ب) بين أن :  $\ln x < x - 1$  ( $\forall x > 1$ ) ثم استنتج أن الدالة  $h$  تناقصية قطعا على المجال  $]1, +\infty[$  0.75

2- (أ) احسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$  ثم ضع جدول تغيرات الدالة  $h$  0.5

(ب) استنتج أن :  $0 < h(x) \leq 1$  ( $\forall x \geq 1$ ) 0.25

#### الجزء الثاني:

نعتبر الدالة العددية  $g$  المعرفة على المجال  $[1, +\infty[$  بما يلي :  $g(1) = \ln 2$  و  $g(x) = \int_x^{x^2} \frac{1}{\sqrt{t} \ln t} dt$  ( $\forall x > 1$ )

و ليكن  $(C)$  المنحنى الممثل للدالة  $g$  في معلم متعامد ممنظم  $(O, \vec{i}, \vec{j})$

$$(1-1) \text{ تحقق أن : } \int_x^{x^2} \frac{1}{t \ln t} dt = \ln 2 \quad (\forall x > 1) \quad 0.25$$

$$(1-2) \text{ تحقق أن : } g(x) - \ln 2 = \int_x^{x^2} \frac{\sqrt{t} - 1}{t \ln t} dt \quad (\forall x > 1) \quad 0.25$$

$$(1-3) \text{ بين أن : } g(x) - \ln 2 = \int_{\sqrt{x}}^x \frac{t-1}{t \ln t} dt \quad (\forall x > 1) \quad 0.5$$

$$(2-1) \text{ بين أن : } (x - \sqrt{x})h(x) \leq g(x) - \ln 2 \leq (x - \sqrt{x})h(\sqrt{x}) \quad (\forall x > 1) \quad 0.5$$

(ب) استنتج أن الدالة  $g$  قابلة للاشتقاق على اليمين في 1 0.5

$$(1-3) \text{ بين أن : } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty \text{ و أن : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = 0 \quad 0.75$$

$$(3-1) \text{ بين أن الدالة } g \text{ قابلة للاشتقاق على المجال } ]1, +\infty[ \text{ و أن : } g'(x) = \frac{1}{2}h(\sqrt{x}) \quad (\forall x > 1) \quad 0.75$$

$$(1-3) \text{ بين أن الدالة } g \text{ قابلة للاشتقاق على المجال } ]1, +\infty[ \text{ و أن : } g'(x) = \frac{1}{2}h(\sqrt{x}) \quad (\forall x > 1) \quad 0.75$$

$$(ب) استنتج أن :  $0 < g'(x) \leq \frac{1}{2}$   $(\forall x \geq 1)$  ثم ضع جدول تغيرات الدالة  $g$  0.5$$

(ج) أنشئ المنحنى (C) 0.5

### الجزء الثالث:

$$I-1 \text{ بين أن الدالة } k : x \mapsto g(x) - x + 1 \text{ تقابل من المجال } ]1, +\infty[ \text{ نحو المجال } ]-\infty, \ln 2] \quad 0.5$$

$$I-2 \text{ استنتج أنه يوجد عدد حقيقي وحيد } \alpha \text{ من المجال } ]1, +\infty[ \text{ بحيث : } 1 + g(\alpha) = \alpha \quad 0.25$$

$$II- \text{ نعتبر المتتالية العددية } (u_n)_{n \geq 0} \text{ المعرفة بما يلي : } 1 \leq u_0 < \alpha \text{ و } u_{n+1} = 1 + g(u_n) \quad (\forall n \geq 0) \quad 0.25$$

$$(1-1) \text{ بين أن : } 1 \leq u_n < \alpha \quad (\forall n \geq 0) \quad 0.5$$

$$(ب) \text{ بين أن المتتالية } (u_n)_{n \geq 0} \text{ تزايدية قطعاً.} \quad 0.5$$

$$(ج) \text{ استنتج أن المتتالية } (u_n)_{n \geq 0} \text{ متقاربة و أن : } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha \quad 0.75$$

$$(1-2) \text{ بين أن : } |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2}|u_n - \alpha| \quad (\forall n \geq 0) \quad 0.5$$

$$(ب) \text{ بين أن : } |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - \alpha| \quad (\forall n \geq 0) \quad 0.5$$

$$(ج) \text{ استنتج مرة ثانية أن : } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha \quad 0.25$$

انتهى