

REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTRE DE L'EDUCATION ◆◆◆ EXAMEN DU BACCALAUREAT SESSION DE JUIN 2013	Epreuve : MATHEMATIQUES
	Durée : 3 H
	Coefficient : 3
Section : Sciences expérimentales	SESSION PRINCIPALE

Le sujet comporte 4 pages. La page 4 / 4 est à rendre avec la copie.


Exercice 1 (3 points)

Dans la figure ci - contre, ABCDEFGH est un cube d'arête 1.

Le point I est le milieu du segment $[AC]$.

Le point J est le milieu du segment $[EG]$.

L'espace est muni du repère orthonormé direct $(A, \overline{AB}, \overline{AD}, \overline{AE})$.



Répondre par vrai ou faux à chacune des propositions suivantes en justifiant la réponse.

- 1) $\overline{AC} \wedge \overline{BD} = \overline{AE}$.
- 2) $(\overline{IA} \wedge \overline{IG}) \cdot \overline{JJ} = 0$.
- 3) La sphère de diamètre $[AC]$ est tangente au plan d'équation $z - 1 = 0$.


Exercice 2 (6 points)

I. Dans la figure ci - contre, on a représenté dans

un repère orthogonal (O, \vec{i}, \vec{j}) la courbe C_f

de la fonction f définie sur \mathbb{R} par $f(x) = x^3 + 6x + 2$.

- 1) Justifier que l'équation $x^3 + 6x + 2 = 0$ admet dans \mathbb{R} une solution unique α .
- 2) Donner un encadrement de α d'amplitude 10^{-1} .



II. On se propose dans cette partie de déterminer la valeur exacte de α .

1) On considère dans \mathbb{C} les équations $(E_1): z^3 = 2$ et $(E_2): z^3 = -4$.

a) Justifier que les solutions de (E_1) sont $a_1 = \sqrt[3]{2}$, $a_2 = \sqrt[3]{2} e^{i\frac{2\pi}{3}}$ et $a_3 = \sqrt[3]{2} e^{i\left(\frac{-2\pi}{3}\right)}$.

b) Justifier que les solutions de (E_2) sont $b_1 = -\sqrt[3]{4}$, $b_2 = \sqrt[3]{4} e^{i\frac{\pi}{3}}$ et $b_3 = \sqrt[3]{4} e^{i\left(\frac{-\pi}{3}\right)}$.

c) Vérifier que $a_1 b_1 = a_2 b_2 = a_3 b_3 = -2$.

2) Soit a et b deux nombres complexes vérifiant $a^3 + b^3 = -2$ et $ab = -2$.

a) Vérifier que $(a + b)^3 = -2 - 6(a + b)$.

b) En déduire que $a + b$ est une solution de l'équation $z^3 + 6z + 2 = 0$.

3) Déduire les solutions de l'équation $z^3 + 6z + 2 = 0$.

4) Conclure.

Exercice 3 (5 points)

Une étude a été faite sur une population de 22 mouches se reproduisant assez rapidement.

Le tableau suivant donne le nombre N de mouches après un temps T exprimé en jours.

T	0	9	12	18	25	33	39	48	57	66	69	75
N	22	39	105	225	499	791	938	1005	1028	1033	1034	1034

1) Quelle conjecture peut-on émettre sur le nombre de mouches au bout de 85 jours ?

2) On pose $M = \ln\left(\frac{1035}{N} - 1\right)$.

Les valeurs de M , arrondies à 10^{-3} près, sont données dans le tableau suivant :

T	0	9	12	18	25	33	39	48	57	66	69	75
M	3.830	3.240	2.181	1.281	0.072	-1.176	-2.269	-3.512	-4.989	-6.247	-6.941	-6.941

a) Donner une valeur approchée à 10^{-3} près du coefficient de corrélation linéaire entre T et M .

b) Donner une équation de la droite de régression de M en T . (les coefficients seront arrondis à 10^{-3} près).

3) a) Montrer que $N = \frac{1035}{1 + e^M}$.

b) Dédurre que $N = \frac{1035}{1 + \alpha e^{-\beta T}}$, où α et β sont deux réels positifs que l'on déterminera.

4) En utilisant la question 3) b), valider ou réfuter la conjecture émise en 1).

Exercice 4 (6 points)

Dans l'annexe ci-jointe (O, \vec{i}, \vec{j}) est un repère orthonormé et C_f est la courbe représentative de la fonction f définie sur $[3, +\infty[$ par $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 9})$.

Soit E la partie du plan limitée par la courbe C_f et les droites d'équations $x = 3$, $x = 5$ et $y = \ln 3$. On désigne par A l'aire (en unité d'aire) de E .

1) Hachurer E .

2) a) Vérifier que $f(5) = 2\ln 3$.

b) Soit M et N les points de la courbe C_f d'abscisses respectives 3 et 5 et P et Q les points de coordonnées respectives $(5, \ln 3)$ et $(3, 2\ln 3)$.

Placer, dans le repère (O, \vec{i}, \vec{j}) , les points M, N, P et Q .

c) Calculer l'aire du rectangle $MPNQ$ et l'aire du triangle MPN .

d) En déduire que $\ln 3 \leq A \leq 2\ln 3$.

3) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

b) En utilisant le graphique, justifier que f réalise une bijection de $[3, +\infty[$ sur l'intervalle $[\ln 3, +\infty[$.

4) Soit g la fonction réciproque de la fonction f et C_g sa courbe représentative dans le repère (O, \vec{i}, \vec{j}) .
Tracer la courbe C_g .

5) Soit E' la partie du plan limitée par la courbe C_g et les droites d'équations $x = \ln 3$, $x = 2\ln 3$ et $y = 5$. On désigne par A' l'aire (en unité d'aire) de E' .

a) Hachurer E' .

b) Montrer que $A' = 5\ln 3 - \int_{\ln 3}^{2\ln 3} g(x) dx$.

6) a) Montrer que pour tout réel x de l'intervalle $[\ln 3, +\infty[$, $g(x) = \frac{e^x + 9e^{-x}}{2}$.

b) Calculer $\int_{\ln 3}^{2\ln 3} g(x) dx$ et en déduire la valeur de A .