

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

الدورة الاستدراكية 2013

الموضوع



RS22



3	مدة التحضير	الرياضيات	المادة
7	المعامل	شعبة العلوم التجريبية بمسالكها ونسبة العلوم والتكنولوجيا بمسلكها	الشعبتين أو اثنتين

معلومات عامة

- يسمح باستعمال الآلة الحاسبة غير القابلة للبرمجة ؛
- مدة إنجاز موضوع الامتحان : 3 ساعات ؛
- عدد الصفحات : 3 صفحات (الصفحة الأولى تتضمن معلومات والصفحتان التاليتان تتضمنان تمارين الامتحان) ؛
- يمكن للمرشح إنجاز تمارين الامتحان حسب الترتيب الذي يناسبه ؛
- في حالة عدم تمكن المرشح من الإجابة عن سؤال ما ، يمكنه استعمال نتيجة هذا السؤال لمعالجة الأسئلة الموالية ؛
- ينبغي تفادي استعمال اللون الأحمر عند تحرير الأجوبة ؛
- بالرغم من تكرار بعض الرموز في أكثر من تمرين ، فكل رمز مرتبط بالتمرين المستعمل فيه ولا علاقة له بالتمارين السابقة أو اللاحقة .

معلومات خاصة

يتكون الموضوع من خمسة تمارين مستقلة فيما بينها و تتوزع حسب المجالات كما يلي :

النقطة الممنوحة	المجال	التمرين
3 نقط	الهندسة الفضائية	التمرين الأول
3 نقط	الأعداد العقدية	التمرين الثاني
3 نقط	المتتاليات العددية	التمرين الثالث
3 نقط	حساب الاحتمالات	التمرين الرابع
8 نقط	دراسة دالة وحساب التكامل	التمرين الخامس

- بالنسبة للتمرين الخامس ، \ln يرمز لدالة اللوغاريتم النيبيري

الموضوع

التمرين الأول (3 ن)

- نعتبر، في الفضاء المنسوب إلى نظم متعامد منظم مباشر $(O, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k})$ ، النقط $A(0,0,1)$ و $B(1,1,1)$ و $C(2,1,2)$ و الفلكة (S) التي مركزها $\Omega(1,-1,0)$ و شعاعها هو $\sqrt{3}$
- (1) 0.75 بين أن $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 1 = 0$ هي معادلة ديكارتية لفلكة (S) وتحقق من أن A تنتمي إلى (S)
- (2) 0.75 أ- بين أن $\overline{AB} \wedge \overline{AC} = \bar{i} - \bar{j} - \bar{k}$ واستنتج أن $x - y - z + 1 = 0$ هي معادلة ديكارتية للمستوى (ABC)
- ب- احسب المسافة $d(\Omega, (ABC))$ ثم استنتج أن المستوى (ABC) مماس للفلكة (S) في A
- (3) 0.75 ليكن (Δ) المستقيم المار من Ω والعمودي على (ABC)
- أ- بين أن
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 - t \\ z = -t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$
 تمثيل بارامتري للمستقيم (Δ)
- ب- استنتج بثلاثي إحداثيات نقطتي تقاطع المستقيم (Δ) و الفلكة (S)

التمرين الثاني (3 ن)

- (1) 0.75 حل في مجموعة الأعداد العقدية C المعادلة: $z^2 - 8z + 25 = 0$
- (2) نعتبر، في المستوى العقدي المنسوب إلى معلم متعامد منظم مباشر (O, \bar{u}, \bar{v}) ، النقط A و B و C التي إحداثياتها على التوالي هي: $a = 4 + 3i$ و $b = 4 - 3i$ و $c = 10 + 3i$ والإزاحة T التي متجهتها \overline{BC}
- أ- بين أن لحق النقطة D صورة النقطة A بالإزاحة T هو $d = 10 + 9i$
- ب- تحقق من أن $\frac{b-a}{d-a} = -\frac{1}{2}(1+i)$ ثم اكتب العدد العقدي $-\frac{1}{2}(1+i)$ على الشكل المثلي.
- ج- بين أن $\arg(\overline{AD}, \overline{AB}) \equiv \frac{5\pi}{4} [2\pi]$

التمرين الثالث (3 ن)

- نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة بما يلي: $u_0 = 2$ و $u_{n+1} = \frac{1}{5}u_n + \frac{4}{5}$ لكل n من \mathbb{N}
- (1) 0.5 تحقق من أن $u_{n+1} - 1 = \frac{1}{5}(u_n - 1)$ لكل n من \mathbb{N}
- (2) 0.5 أ- بين بالترجع أن $u_n > 1$ لكل n من \mathbb{N}
- ب- بين أن المتتالية (u_n) تناقصية.
- ج- استنتج أن المتتالية (u_n) متقاربة.
- (3) 0.25 لنكن (v_n) المتتالية العددية بحيث $v_n = u_n - 1$ لكل n من \mathbb{N}
- أ- بين أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{5}$ ثم اكتب v_n بدلالة n
- ب- بين أن $u_n = \left(\frac{1}{5}\right)^n + 1$ لكل n من \mathbb{N} ثم احسب نهاية المتتالية (u_n)

التسعين الرابع (3 ن)

- يحتوي كيس على 9 بيذقات : أربع بيذقات بيضاء و ثلاث بيذقات سوداء و بيذقتان خضراوان (لا يمكن التمييز بين البيذقات باللمس)
نسحب عشوائيا وفي آن واحد ثلاث بيذقات من الكيس .

1) نعتبر الحدثين A : "الحصول على ثلاث بيذقات من نفس اللون" و B : "الحصول على ثلاث بيذقات مختلفة اللون مثنى مثنى".

بين ان $P(A) = \frac{5}{84}$ و $P(B) = \frac{2}{7}$

2) ليكن X المتغير العشوائي الذي يساوي عدد البيذقات السوداء المسحوبة
ا - تحقق من ان القيم التي يأخذها المتغير العشوائي X هي 0 و 1 و 2 و 3

ب- بين ان $P(X=2) = \frac{3}{14}$ و $P(X=1) = \frac{15}{28}$

ج - أعط قانون احتمال المتغير العشوائي X

التسعين الخامس (3 ن)

I- نعتبر الدالة العددية g المعرفة على $]0, +\infty[$ بما يلي : $g(x) = x^2 - x - \ln x$

1) ا- تحقق من ان $2x^2 - x - 1 = (2x+1)(x-1)$ لكل x من \mathbb{R} .

ب- بين ان $g'(x) = \frac{2x^2 - x - 1}{x}$ لكل x من $]0, +\infty[$ واستنتج ان الدالة g تناقصية على $]0, 1[$ و تزايدية على $]1, +\infty[$.

2) بين ان $g(x) \geq 0$ لكل x من $]0, +\infty[$ (لاحظ ان $g(1) = 0$)

II- نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $]0, +\infty[$ بما يلي : $f(x) = x^2 - 1 - (\ln x)^2$

و ليكن (C) المنحنى الممثل للدالة f في معلم متعامد ممنظم (O, i, j) (الوحدة : 1 cm) .

1) ا- بين ان $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$ و اول هندسيا هذه النتيجة .

ب- بين ان $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$ (لاحظ ان $f(x) = x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2} - \left(\frac{\ln x}{x} \right)^2 \right)$)

ج- استنتج ان المنحنى (C) يقبل فرعا شلجيا بجوار $+\infty$. يتم تحديد اتجاهه .

2) ا- بين ان $f'(x) = 2 \left(\frac{x^2 - \ln x}{x} \right)$ لكل x من $]0, +\infty[$

ب- تحقق من ان $\frac{g(x)}{x} + 1 = \frac{x^2 - \ln x}{x}$ لكل x من $]0, +\infty[$ و استنتج ان الدالة f تزايدية على $]0, +\infty[$

3) ا- بين ان $y = 2x - 2$ هي معادلة ديكارتية للمستقيم (T) المماس للمنحنى (C) في النقطة $A(1, 0)$

ب- انشئ في نفس المعلم (O, i, j) المستقيم (T) والمنحنى (C) (تقبل ان للمنحنى (C) نقطة انعطاف وحيدة هي A)

4) ا- تحقق من ان $H : x_1 \rightarrow x(\ln x - 1)$ دالة أصلية للدالة $h : x \rightarrow \ln x$ على $]0, +\infty[$ ثم بين ان $\int_1^e \ln x \, dx = 1$

ب- باستعمال مكاملة بالأجزاء ، بين ان : $\int_1^e (\ln x)^2 \, dx = e - 2$

ج- بين ان مساحة حيز المستوى المحصور بين (C) ومحور الإحداثيات و المستقيمين اللذين معادلتهما $x = 1$

و $x = e$ هي $\frac{1}{3}(e^3 - 6e + 8) \text{ cm}^2$