

∞ **Corrigé du baccalauréat Asie 7 juin 2021 Jour 1** ∞

ÉPREUVE D'ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

Le candidat traite 4 exercices : les exercices 1, 2 et 3 communs à tous les candidats et un seul des deux exercices A ou B.

EXERCICE 1

5 points

Commun à tous les candidats

En 2020, une influenceuse sur les réseaux sociaux compte 1 000 abonnés à son profil. On modélise le nombre d'abonnés ainsi : chaque année, elle perd 10 % de ses abonnés auxquels s'ajoutent 250 nouveaux abonnés.

Pour tout entier naturel n , on note u_n le nombre d'abonnés à son profil en l'année $(2020 + n)$, suivant cette modélisation. Ainsi $u_0 = 1\,000$.

1. On a donc $u_1 = 1\,000 \times \left(1 - \frac{10}{100}\right) + 250 = 1\,000 \times 0,9 + 250 = 900 + 250 = 1\,150$.

2. Enlever 10 % c'est multiplier par $1 - \frac{10}{100} = 1 - 0,10 = 0,90$.

Le nombre d'abonnés de l'année précédente est donc multiplié par 0,9; on ajoute ensuite chaque année 250 nouveaux abonnés, donc pour tout naturel n :

$$u_{n+1} = 0,9u_n + 250.$$

3. $u(10)$ donne le nombre d'abonnés au bout de 10 ans; une calculatrice donne *approx* 1977.

4. **a. Initialisation** : on a $u_0 = 1\,000 \leq 2\,500$: la relation est vraie au rang 0;

Hérédité : on suppose que pour $n \in \mathbb{N}$, on ait $u_n \leq 2\,500$.

La multiplication par $0,9 > 0$ respectant l'ordre, on a donc $0,9u_n \leq 0,9 \times 2\,500$ ou $0,9u_n \leq 2\,250$, puis en ajoutant 250 à chaque membre :

$0,9u_n + 250 \leq 2\,250 + 250$, soit $u_{n+1} \leq 2\,500$: la relation est encore vraie au rang $n + 1$.

La relation est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang $n \in \mathbb{N}$, elle est vraie au rang $n + 1$: d'après le principe de récurrence : quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq 2\,500$.

b. Soit $n \in \mathbb{N}$, on a $u_{n+1} - u_n = 0,9u_n + 250 - u_n = -0,1u_n + 250$.

Or d'après la question précédente : $u_n \leq 2\,500$, puis $0,1u_n \leq 0,1 \times 2\,500$ ou encore $0,1u_n \leq 250$, soit en prenant les opposés : $-250 \leq -0,1u_n$ et en ajoutant à chaque membre 250 : $0 \leq -0,1u_n + 250$.

On a donc pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n \geq 0$ ou $u_{n+1} \geq u_n$: la suite (u_n) est croissante.

c. La suite (u_n) est croissante (d'après 4. b.) et majorée par 2 500 (d'après 4. a.) : elle converge donc vers une limite inférieure ou égale à 2 500.

5. **a.** Pour $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = u_{n+1} - 2\,500 = 0,9u_n + 250 - 2\,500$, soit

$$v_{n+1} = 0,9u_n - 2\,250 = 0,9(u_n - 2\,500) = 0,9v_n.$$

L'égalité vraie quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 0,9v_n$ montre que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison 0,9 et de terme initial $v_0 = u_0 - 2\,500 = 1\,000 - 2\,500 = -1\,500$.

b. On sait que quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $v_n = v_0 \times 0,9^n = -1500 \times 0,9^n$.

$$\text{Or } v_n = u_n - 2500 \iff u_n = v_n + 2500 = 2500 - 1500 \times 0,9^n.$$

c. Comme $0 < 0,9 < 1$, on sait que $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,9^n = 0$ et par suite par produit de limites $\lim_{n \rightarrow +\infty} -1500 \times 0,9^n = 0$ et finalement $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2500$.

6. Écrire un programme qui permet de déterminer en quelle année le nombre d'abonnés dépassera 2 200.

Déterminer cette année.

```


n = 0
u = 1000
while u < 2200 :
    u = 0,9*u + 250
    n = n+1
return n

```

Le programme s'arrêtera la 16^e année.

EXERCICE 2 commun à tous les candidats

5 points



Partie I

1. On a $P(6; 0; 0)$ et $Q(0; 0; 6)$.

2. On a $\overrightarrow{PQ} \begin{pmatrix} -6 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{PQ} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 8 \end{pmatrix}$.

+ $\vec{n} \cdot \overrightarrow{PQ} = -6 + 0 + 6 = 0$: les vecteurs \vec{n} et \overrightarrow{PQ} sont orthogonaux;

+ $\vec{n} \cdot \overrightarrow{PR} = 2 - 10 + 8 = 0$: les vecteurs \vec{n} et \overrightarrow{PR} sont orthogonaux.

Conclusion : le vecteur \vec{n} orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan PQR est normal à ce plan.

3. D'après le résultat précédent :

$$M(x; y; z) \in (\text{PQR}) \iff 1x - 5y + 1z + d = 0, \text{ avec } d \in \mathbb{R}.$$

$$\text{Or } P(6; 0; 0) \in (\text{PQR}) \iff 1 \times 6 - 5 \times 0 + 1 \times 0 + d = 0 \iff d = -6.$$

$$\text{Donc } M(x; y; z) \in (\text{PQR}) \iff x - 5y + z - 6 = 0.$$

Partie II

1. + Les plans (ABCD) et (EFGH) sont parallèles, donc les droites (AC) et (EG) sont parallèles;

+ Les droites (AE) et (CG) sont perpendiculaires au plan (ABCD), elles sont donc parallèles.

Le quadrilatère (AEGC) ayant ses côtés opposés parallèles est donc un parallélogramme; ses diagonales [AG] et [CE] ont donc le même milieu Ω .

Comme $G(8; 8; 8)$, les coordonnées de Ω sont donc $\left(\frac{0+8}{2}; \frac{0+8}{2}; \frac{0+8}{2}\right) = (4; 4; 4)$.

2. La droite (d) a donc pour vecteur directeur \vec{n} et contient Ω , donc :

$$M(x; y; z) \in (d) \iff \overrightarrow{\Omega M} = t \vec{n}, \text{ avec } t \in \mathbb{R}, \text{ soit :}$$

$$\begin{cases} x - 4 = t \times 1 \\ y - 4 = t \times (-5) \\ z - 4 = t \times 1 \end{cases}, t \in \mathbb{R} \iff \begin{cases} x = 4 + t \\ y = 4 - 5t \\ z = 4 + t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

3. L est le projeté orthogonal du point Ω sur le plan (PQR) donc la droite (ΩL) est perpendiculaire au plan (PQR), c'est donc la droite (d).

L est donc le point commun au plan (PQR) et à la droite (d), ses coordonnées vérifient donc le système :

$$\begin{cases} x = 4 + t \\ y = 4 - 5t \\ z = 4 + t \\ x - 5y + z - 6 = 0 \end{cases}, t \in \mathbb{R} \Rightarrow 4 + t - 5(4 - 5t) + 4 + t - 6 = 0 \iff 2 + 2t - 20 + 25t =$$

$$0 \iff 27t = 18 \iff 9 \times 3t = 9 \times 2 \iff 3t = 2 \iff t = \frac{2}{3}.$$

En reportant cette valeur de t dans les trois premières équations du système, on trouve

$$\text{que } L\left(\frac{14}{3}; \frac{2}{3}; \frac{14}{3}\right).$$

4. Puisque A est l'origine du repère on a $AL^2 = \left(\frac{14}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{14}{3}\right)^2 = \frac{196 + 4 + 196}{9} = \frac{396}{9} = 44$.

$$\text{On a donc } AL = \sqrt{44} = \sqrt{4 \times 11} = 2\sqrt{11}.$$

EXERCICE 3 commun à tous les candidats**5 points**

1. a. Il y a 7 tirages contenant la lettre A, puis 6 tirages contenant la lettre B (le tirage AB étant le même que le tirage BA), 5 tirages contenant la lettre C, etc.
Il y a donc : $7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = \frac{7 \times 8}{2} = 7 \times 4 = 28$ tirages différents.
- b. Les tirages gagnant sont les 6 tirages contenant la lettre A et une consonne et les 6 contenant la lettre E et une consonne : il y a donc $6 + 6 = 12$ tirages gagnants.
La probabilité que le joueur gagne à ce jeu est donc égale à $\frac{12}{28} = \frac{4 \times 3}{4 \times 7} = \frac{3}{7}$.
2. a. On a $P(G = 10 - k) = \frac{3}{7}$ et $P(G = -k) = \frac{4}{7}$. D'où le tableau :

G	$-k$	$10 - k$
$P(G = \dots)$	$\frac{4}{7}$	$\frac{3}{7}$

- b. L'espérance mathématique de la variable aléatoire G est égale à

$$E(G) = -k \times \frac{4}{7} + (10 - k) \times \frac{3}{7} = \frac{-4k + 30 - 3k}{7} = \frac{30 - 7k}{7}.$$

Le jeu est favorable au joueur si :

$$E(G) > 0 \iff \frac{30 - 7k}{7} > 0 \iff 30 - 7k > 0 \iff 7k < 30 \iff k < \frac{30}{7}.$$

$$\frac{30}{7} \approx 4,3.$$

La somme payée au départ pour que le jeu reste favorable au joueur ne doit pas dépasser 4 €.

3. a. Le tirage par un joueur est indépendant de celui des autres et chacun a une probabilité de gagner de $\frac{3}{7}$; X suit donc une loi binomiale de paramètres $n = 10$ et $p = \frac{3}{7}$.
- b. On a $p(X = 4) = \binom{10}{4} \left(\frac{3}{7}\right)^4 \left(1 - \frac{3}{7}\right)^{10-4} = 210 \times \left(\frac{3}{7}\right)^4 \times \left(\frac{4}{7}\right)^6 \approx 0,2466$, soit 0,247 au millième près.
- c. La calculatrice donne $p(X \geq 5) \approx 0,782$.
La probabilité qu'il y ait au moins 5 gagnants sur 10 joueurs est d'environ 0,782.
- d. On a $P(X \leq n) \geq 0,9 \iff 1 - P(X > n) \geq 0,9 \iff P(X > n) \leq 0,1$.
La calculatrice donne $P(X > 1) \approx 0,031$;
 $P(X > 2) \approx 0,125$.
Le plus entier n tel que $P(X \leq n) \geq 0,9$ est donc $n = 1$.

EXERCICE au choix du candidat**5 points**

Le candidat doit traiter UN SEUL des deux exercices A ou B
Il indique sur sa copie l'exercice choisi : exercice A ou exercice B

EXERCICE – A


Principaux domaines abordés

- convexité
- fonction logarithme

Partie I : lectures graphiques

f désigne une fonction définie et dérivable sur \mathbb{R} .

On donne ci-dessous la courbe représentative de la fonction dérivée f' .



1. On lit $f'(0) = 0,4 = \frac{2}{5}$.

2. a. D'après la figure :

- + $f'(x)$ est croissante si $x \in [-2; 1]$;
- + $f'(x)$ est décroissante si $x < -2$ et si $x > 1$.

b. + $f'(-\frac{1}{2}) = 0$.

Donc $f''(x) > 0$ sur l'intervalle $[-2; 1]$; la fonction f est convexe sur l'intervalle $[-2; 1]$.

Partie II : étude de fonction

La fonction f est définie sur \mathbb{R} par

$$f(x) = \ln\left(x^2 + x + \frac{5}{2}\right).$$

1. + On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + x + \frac{5}{2} = +\infty$, d'où par composition de limites $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$$+ \text{ On a } x^2 + x + \frac{5}{2} = x^2 \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{5}{2x^2} \right).$$

$$\text{Donc } f(x) = \ln x^2 \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{5}{2x^2} \right) = \ln x^2 + \ln \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{5}{2x^2} \right).$$

$$\text{Or } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5}{2x^2 x} = 0, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} 1 + \frac{1}{x} + \frac{5}{2x^2} = 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{5}{2x^2} \right) = \ln 1 = 0.$$

Finalement :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln x^2 = +\infty.$$

2. On a $f(x) = \ln u(x)$, avec $u(x) = x^2 + x + \frac{5}{2}$.

u étant dérivable sur \mathbb{R} et pour le trinôme $x^2 + x + \frac{5}{2}$, $\Delta = 1 - 10 = -9 < 0$, donc

$$x^2 + x + \frac{5}{2} > 0 \text{ quel que soit le réel } x.$$

La fonction $\ln u$ est donc dérivable sur \mathbb{R} et sur cet intervalle :

$$(\ln u)' = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2x+1}{x^2 + x + \frac{5}{2}}.$$

$$\text{Conclusion : quel que soit } x \in \mathbb{R}, f'(x) = \frac{2x+1}{x^2 + x + \frac{5}{2}}.$$

3. On a vu que $x^2 + x + \frac{5}{2} > 0$ sur \mathbb{R} ; le signe de $f'(x)$ est donc celui de $2x+1$:

$$+ f'(x) > 0 \iff 2x+1 > 0 \iff x > -\frac{1}{2} : \text{ la fonction } f \text{ est croissante sur } \left] -\frac{1}{2}; +\infty \right[;$$

$$+ f'(x) < 0 \iff 2x+1 < 0 \iff x < -\frac{1}{2} : \text{ la fonction } f \text{ est décroissante sur } \left] -\infty; -\frac{1}{2} \right[.$$

$$\text{On a } f\left(-\frac{1}{2}\right) = \ln \left(\left(-\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} + \frac{5}{2} \right) = \ln \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} + \frac{5}{2} \right) = \ln \frac{9}{4}.$$

D'où le tableau de variations de f :

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
	$+\infty$		$+\infty$
	$\ln \frac{9}{4}$		

4. a. Dans le tableau précédent $f\left(-\frac{1}{2}\right) = \ln \frac{9}{4} \approx 0,81$.

Sur l'intervalle $\left] -\frac{1}{2}; +\infty \right[$ la fonction f est continue car dérivable et comme $2 \in \left[\ln \frac{9}{4}; +\infty \right[$, il existe d'après le théorème des valeurs intermédiaires un réel unique $\alpha \in \left] -\frac{1}{2}; +\infty \right[$ tel que $f(\alpha) = 2$.

b. La calculatrice donne :

$$f(1) \approx 1,5 \text{ et } f(2) \approx 2,14, \text{ donc } \alpha \in]1; 2[;$$

$$f(1,7) \approx 1,96 \text{ et } f(1,8) \approx 2,02, \text{ donc } \alpha \in]1,7; 1,8[;$$

$$f(1,76) \approx 1,995 \text{ et } f(1,77) \approx 2,002, \text{ donc } \alpha \in]1,76; 1,77[.$$

Conclusion $\alpha \approx 1,8$ à 10^{-1} près.

5.

La fonction a un point d'inflexion si en ce point sa dérivée seconde s'annule en changeant de signe.

Comme $\left(x^2 + x + \frac{5}{2}\right)^2 > 0$, quel que soit le réel x , le signe de $f''(x)$ est celui du trinôme $-2x^2 - 2x + 4$ ou de $-x^2 - x + 2 = -(x^2 + x - 2) = -\left[\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} - 2\right] = -\left[\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}\right] = -\left(x - \frac{1}{2} + \frac{3}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2} - \frac{3}{2}\right) = -(x+1)(x-2)$.

Le tableau de signes :

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
$x+1$	$-$	0	$+$	$+$
$x-2$	$-$	$-$	0	$+$
$(x+1)(x-2)$	$+$	0	$-$	$+$
$-(x+1)(x-2)$	$-$	0	$+$	$-$

On constate que la dérivée seconde s'annule en changeant de signe en -1 et en 2 . La courbe a donc deux points d'inflexion.

EXERCICE - B

Principaux domaines abordés

- Étude de fonction, fonction exponentielle
- Équations différentielles

Partie I

$$y' = -0,4y + 0,4$$

1. a. $y = K$, avec $K \in \mathbb{R}$ est solution de l'équation, si, avec $y' = 0$,

$$0 = -0,4K + 0,4 \iff 0,4K = 0,4 \iff K = 1$$

b. + On sait que les solutions de l'équation différentielle $y' = -0,4y$ sont les fonctions définies par : $t \mapsto y = Ce^{-0,4t}$, avec $C \in \mathbb{R}$;

+ Les solutions de l'équation $y' = -0,4y + 0,4$ sont donc les fonctions :

$$t \mapsto y = 1 + Ce^{-0,4t}, \text{ avec } C \in \mathbb{R}.$$

c. g définie par $g(t) = 1 + Ce^{-0,4t}$ vérifie :

$$g(0) = 10 \iff 1 + Ce^{-0,4 \times 0} = 10 \iff 1 + C = 10 \iff C = 9.$$

$$\text{On a donc } g(t) = 1 + 9e^{-0,4t}$$

Partie II

1. On sait que $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-0,4t} = 0$, donc $\lim_{t \rightarrow +\infty} p(t) = 1$.
2. g somme de fonctions dérivables sur \mathbb{R} est dérivable et sur cet intervalle :
 $g'(t) = -0,4 \times 9e^{-0,4t} = -3,6e^{-0,4t}$.
 Or $p(t) = \frac{1}{g(t)} \Rightarrow p'(t) = -\frac{g'(t)}{(g(t))^2} = -\frac{-3,6e^{-0,4t}}{(1+9e^{-0,4t})^2} = \frac{3,6e^{-0,4t}}{(1+9e^{-0,4t})^2}$ pour tout $t \in [0; +\infty[$.
3. **a.** Le résultat précédent montre que, comme $3,6 > 0$, $e^{-0,4t} > 0$ quel que soit le réel y , $(1+9e^{-0,4t})^2 > 0$, $p'(t) > 0$ sur $[0; +\infty[$: la fonction p est strictement croissante sur cet intervalle.
 Or $p(0) = \frac{1}{1+9} = \frac{1}{10} = 0,1$, et $\lim_{t \rightarrow +\infty} p(t) = \frac{1}{1} = 1$.
 Par application du théorème des valeurs intermédiaires comme $\frac{1}{2} \in [0; 1]$, il existe un réel unique $\alpha \in [0; +\infty[$ tel que $p(\alpha) = \frac{1}{2}$.
b. La calculatrice donne :
 $p(5) \approx 0,45$ et $p(6) \approx 0,55$, donc $5 < \alpha < 6$;
 $p(5,4) \approx 0,491$ et $p(5,5) \approx 0,501$, donc $5,4 < \alpha < 5,5$;
 $p(5,49) \approx 0,499$ et $p(5,50) \approx 0,501$, donc $5,49 < \alpha < 5,50$.
 Conclusion $\alpha \approx 5,5$ à 10^{-1} près.

Partie III

1. $p'(t) = \frac{3,6e^{-0,4t}}{(1+9e^{-0,4t})^2}$ d'après la question 2.
 $+0,4p(1-p) = 0,4 \times \frac{1}{1+9e^{-0,4t}} \times \left(1 - \frac{1}{1+9e^{-0,4t}}\right)^2 = 0,4 \times \frac{9e^{-0,4t}}{1+9e^{-0,4t}} = \frac{3,6e^{-0,4t}}{(1+9e^{-0,4t})^2}$,
 donc p est solution de l'équation différentielle.
 De plus on a vu que $p(0) = \frac{1}{10}$.
2. Dans un pays en voie de développement, en l'année 2020, 10 % des écoles ont accès à internet.
 Une politique volontariste d'équipement est mise en œuvre et on s'intéresse à l'évolution de la proportion des écoles ayant accès à internet.
 On note t le temps écoulé, exprimé en année, depuis l'année 2020.
 La proportion des écoles ayant accès à internet à l'instant t est modélisée par $p(t)$.
 Interpréter dans ce contexte la limite de la question II 1 puis la valeur approchée de α de la question II 3. b. ainsi que la valeur $p(0)$.